

Nome del preparato e contenuto	Istruzioni
<p>MOVIPREP (MACROGOL 3350 + ACIDO ASCORBICO):</p> <p>2 buste trasparenti: all'interno di ciascuna sono presenti due bustine (bustina A + bustina B)</p> <p>ATTENZIONE: <u>non assumere</u> MOVIPREP in caso di fenilchetonuria o di carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 18: sciogliete il contenuto della prima busta (bustina A + bustina B) in un litro di acqua non gassata e bevete in un'ora</p> <p>Ore 21: sciogliete la seconda busta (bustina A + bustina B) in un litro d'acqua non gassata e bevete in un'ora</p> <p>Ore 22: bevete un altro litro di acqua non gassata o the deatinato</p> <p>IL GIORNO DELL'ESAME:</p> <p>Digiuno dalla sera precedente</p>

ALCUNE IMPORTANTI INDICAZIONI:

Nei **TRE GIORNI PRECEDENTI** all'esame TC colonscopia virtuale NON ASSUMETE ALIMENTI CHE CONTENGONO SCORIE COME FRUTTA, VERDURA E ALIMENTI INTEGRALI. Potete invece mangiare carne, pesce, formaggi, uova, pasta e pane.

Il giorno prima dell'esame potete pranzare con un pasto leggero, ma dopo le ore 13:00 non assumete cibi solidi.

La sera precedente all'esame cenare con soli liquidi chiari (ad esempio con brodo di carne filtrato).

Portate con Voi la Vostra tessera sanitaria, esami precedenti, la Vostra documentazione clinica e i farmaci che assumete a casa. Potete assumere come di consueto la Vostra terapia domiciliare.

Consigliamo di venire accompagnati.

Il Paziente dovrà presentarsi circa 4 ore prima dell'esecuzione dell'esame DIGIUNO in quanto dovrà assumere oralmente una soluzione di mezzo di contrasto, che ha lo scopo di marcare gli eventuali residui fecali.

Prima dell'acquisizione delle immagini in TC il colon sarà disteso mediante insufflazione di aria.

Allo scopo di ridurre gli spasmi colici, il Medico Radiologo somministrerà un farmaco antispastico per via endovenosa (Buscopan), salvo controindicazioni specifiche.

Revisione

Verificato

Approvato

0

