

Nome del preparato e contenuto	Modalità DOSE UNICA: Se il vostro appuntamento è prima delle ore 11	Modalità "SPLIT": Se il vostro appuntamento è dopo le ore 11 o di pomeriggio
<p>MACROGOL, SIMETICONE, SALI DI SODIO E POTASSIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLENSIA <p>(4 buste A, grandi, e 4 buste B, piccole)</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME</p> <p>ore 17:30: sciogliere le due buste A (grandi) e due buste B (piccole) in un litro d'acqua da assumere in un'ora. Successivamente assumere in mezz'ora un ulteriore mezzo litro di liquidi chiari, non gasati, non alcoolici e senza latte (acqua, camomilla, brodo filtrato, the)</p> <p>Ore 21:30. ripetere il procedimento con le due buste A (grandi) e due buste B (piccole) in un litro d'acqua da assumere in un'ora e successivamente mezzo litro di liquidi chiari in mezz'ora</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME</p> <p>ore 21:00: sciogliere le due buste A (grandi) e due buste B (piccole) in un litro d'acqua da assumere in un'ora. Successivamente assumere in mezz'ora un ulteriore mezzo litro di liquidi chiari, non gasati, non alcoolici e senza latte (acqua, camomilla, brodo filtrato, the)</p> <p>LA MATTINA DELL'ESAME</p> <p>Ore 21:30. ripetere il procedimento con le due buste A (grandi) e due buste B (piccole) in un litro d'acqua da assumere in un'ora e successivamente mezzo litro di liquidi chiari in mezz'ora</p>
<p>MACROGOL 4000</p> <ul style="list-style-type: none"> • SELG 1000 (4 bustine) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • SELG ESSE oppure SELG 250 (16 bustine) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISOCOLAN (4 bustine) 	<p>Se scegliete SELG 1000 ed ESSE sciogliete ogni bustina in un litro di acqua non gassata per un totale di 4 buste in 4 litri di acqua.</p> <p>Se scegliete ISOCOLAN sciogliete 1 busta in mezzo litro di acqua per un totale di 8 buste in 4 litri di acqua.</p> <p>Se scegliete SELG 250 scegliete 4 buste in 1 litro di acqua, per un totale di 16 buste in 4 litri di acqua</p> <p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>assumete dalle ore 17 alle ore 21 i 4 litri di soluzione. Per meglio tollerare la preparazione potete suddividerla in piccole dosi di 250 mL da bere ogni 15 minuti.</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Dalle ore 19 alle ore 21 bevete due litri di soluzione</p> <p>LA MATTINA DELL'ESAME:</p> <p>Dalle ore 06 alle ore 08 bevete i restanti due litri di soluzione</p>
<p>MACROGOL 3350 + ACIDO ASCORBICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOVIPREP (2 bustine trasparenti con all'interno due buste - busta A + busta B) <p><u>Da evitare se affetti da FENILCHETONURIA (contiene aspartame) o FAVISMO (contiene acido ascorbico)</u></p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 18: sciogliete il contenuto della prima bustina (busta A + busta B) in un litro di acqua non gassata e bevetele in un'ora</p> <p>Ore 21: sciogliete la seconda busta trasparente in un litro d'acqua e bevetele in un'ora</p> <p>Ore 22: bevete un altro litro di acqua non gassata o the</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 20: sciogliete il contenuto della prima bustina trasparente (busta A + busta B) in un litro di acqua non gassata e bevetele in un'ora</p> <p>Ore 21:30: bevete un altro litro di acqua non gassata o the deteinato</p>

Revisione

Verificato

Approvato




	deinato	LA MATTINA DELL'ESAME: Ore 07: sciogliete la seconda busta trasparente in un litro d'acqua e bevetela in un'ora
<p>SODIO PICOFOSFATO</p> <ul style="list-style-type: none"> PICOPREP (confezione con 2 bustine) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> CITRAFLEET (confezione con 2 bustine) <p><u>Consultare il proprio medico di riferimento se affetti da insufficienza renale, malattie cardiovascolari o malattie infiammatorie intestinali (M. di Crohn o Rettocolite Ulcerosa)</u></p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 16: Sciogliete la prima bustina in un bicchiere d'acqua, mescolate e aspettate circa 2-3 minuti prima di bere (la soluzione tende a riscaldarsi). A seguire bevete 2 litri di acqua o liquidi chiari</p> <p>Ore 20: Sciogliete la seconda bustina e assumetela allo stesso modo della prima, bevendo sempre a seguire 2 litri di acqua o liquidi chiari.</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 16: Sciogliete la prima bustina in un bicchiere d'acqua, mescolate e aspettate circa 2-3 minuti prima di bere (la soluzione tende a riscaldarsi). A seguire bevete 2 litri di acqua o liquidi chiari</p> <p>LA MATTINA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 6: Sciogliete la seconda bustina e assumetela allo stesso modo della prima, bevendo sempre a seguire 2 litri di acqua o liquidi chiari.</p>
<p>MACROGOL 3350 con BISACODILE</p> <ul style="list-style-type: none"> LOVOLESSE + LOVOLDIL (4 bustine + 4 compresse da assumere insieme) 	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 16: assumete le 4 compresse di LOVOLDIL</p> <p>Ore 20: sciogliete le 4 buste di LOVOLESSE in 2 litri di acqua e assumete la soluzione dividendola in dosi da 250 mL da bere ogni 15-20 minuti. L'intera soluzione dovrà essere assunta in circa 2 ore</p>	<p>IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 16: assumete le 4 compresse (LOVOLDIL)</p> <p>Ore 20: sciogliete 2 buste di LOVOLESSE in 1 litro di acqua e assumete la soluzione dividendola in dosi da 250 mL da bere ogni 15-20 minuti. L'intera soluzione dovrà essere assunta in circa 1 ora</p> <p>LA MATTINA DELL'ESAME:</p> <p>Ore 07: sciogliete 2 buste di LOVOLESSE in 1 litro di acqua e assumete la soluzione dividendola in dosi da 250 mL da bere ogni 15-20 minuti. L'intera soluzione dovrà essere assunta in circa 1 ora</p>

Revisione

Verificato

Approvato




ALCUNE IMPORTANTI INDICAZIONI:

Nei TRE GIORNI PRECEDENTI alla colonscopia NON ASSUMETE ALIMENTI CHE CONTENGONO SCORIE COME FRUTTA, VERDURA E ALIMENTI INTEGRALI. Potete invece mangiare carne, pesce, formaggi, uova, pasta e pane. Il giorno prima dell'esame potete pranzare con un pasto leggero, ma dopo le ore 13:00 non assumete cibi solidi. La sera precedente all'esame cenare con soli liquidi chiari (ad esempio con brodo di carne filtrato).

Portate con voi la vostra tessera sanitaria, esami precedenti, la vostra documentazione clinica e i farmaci che assumete a casa. Potete assumere come di consueto la vostra terapia domiciliare tuttavia **se assumete farmaci antiaggreganti (es. Plavix, Tiklid, Cardirene, Cardioaspirina, DuoPlavin, Brilique, Efient) o anticoagulanti (es. Coumadin, Sintrom, Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto) valutate con il vostro medico di medicina generale o specialista di riferimento, salvo controindicazione assoluta, l'eventuale sospensione in previsione dell'esame e, se necessario, la sostituzione con eparina sottocute.**

Consigliamo di venire accompagnati: il nostro centro offre la possibilità di effettuare l'esame in sedazione, a seguito della quale NON potrete guidare autoveicoli per le 12 ore successive o svolgere attività che richiedano attenzione. Sconsigliamo inoltre di prendere appuntamenti per tutto il resto della giornata.

Si raccomanda, per i pazienti che accedono mediante Servizio Sanitario Nazionale, che è necessario presentarsi con l'impegnativa del proprio Medico Curante (non sono accettate lettere screening o modulistiche di altro genere).